

BAĞ GÖZKURDU

(*Theresimima ampelophaga*)



Bağ göz kurdu ergini



Bağ göz kurdu zararı

Tanımı ve Yaşayışı:

●Bağ göz kurdu keleklerinin kanatları siyahımsı duman renginde olup, lacivert pırıltılıdır. Vücut metalik yeşil renktedir. Larva bol tüylü, sırtı esmer, abdomenin ventrali kirli sarı renkli olup, vücudun üstünde iki, yanlarında iki olmak üzere toplam 4 adet çizgi vardır. Larvalar önce gözlerde, daha sonra da genç yapraklarda beslenirler. Beslenme akşamüstü başlar, ertesi gün sabaha kadar devam eder. İlk kelekler haziran - temmuz ayları arasında görülür. Zararlı yılda 1-1.5 döl vermektedir.

Zarar Şekli:

●Larvalar ilkbaharda gözlerin içini yiyerek ölümüne neden olur. Zarar gören bağa uzaktan bakıldığında don vurmuş gibi görülür. İkinci döl larvaları ise, yaprakların alt yüzünde beslenerek damar aralarını zar şeklinde bırakır. Ancak gözlerdeki zararı yapraktaki zararından daha önemlidir. Gözler uyanırken bir asmada 3-4 larva bulunduğu %40-50, 10-12 larva bulunduğu %100 zarar yapabilir. Bir asmada 1-2 adet larvanın bulunması halinde dahi ürün kaybına neden olur.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

●Bağ göz kurdu, monofag bir zararlıdır. Kültür asmaları ve yabancı asmalarda zarar yapar.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler :

●Bağ göz kurdu kışı larva halinde asmaların kabukları altında geçirdiğinden, kavlayan kabuklar soyulmalı, budama artıkları bağ kenarında bırakılmamalıdır. Bağın içinde ve çevresinde larvaların kışlayabileceği barınak yerleri ortadan kaldırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.