

KARA ÇEKİRGE (*Melanogryllus desertus*)
BAĞ HOROZCUĞU (*Oecanthus pellucens*)



Tanımı ve Yaşayışı:

- Vücut, nimf ve erginlerde parlak siyah renktedir. Antenler uzundur.
- Kara çekirgeler kışı nimf halinde geçirir.
- İlkbahar aylarında gelişmeye ve aşırı şekilde beslenmeye devam ederler.
- Nimfler ekim ayından itibaren kışlama yerlerine çekilirler.
- Yılda 1 döl verirler.

Zarar Şekli:

- Bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaparlar.
 - Özellikle genç bitkilerde zarar çok yüksek olmaktadır.
- Çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini yemek suretiyle ekonomik düzeyde zarar yaparlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Bir çok kültür bitkisi üzerinde beslenirler, çayır ve meralarda, tarla ve yem bitkilerinde, hububat, ayçiçeği, pamuk ve bağda; çayır ve otlaklarda, bağ ve meyve fidanlarında, yeni gelişen tohumların kök ve sapında, bağlarda omcaların körpe filizlerinde, sebzelerde, pancar, pamuk ve tütün fidelerinde beslenir ve zarar yaparlar.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

- Toplu haldeki yumurtlama yerlerinin sürülerek yumurtaların yok edilmesi yöntemi, çekirge yoğunluğunu azaltmak yönünden faydalı olabilir

Kimyasal Mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.