

## SALYANGOZLAR

( *Helix* spp., *Helicella* spp., *Eobania* spp.)

## SÜMÜKLÜ BÖCEKLER

( *Agriolimax agrestis*, *Arion* spp., *Limax* spp.)



Sümüklü Böcekler



Salyangozlar

### Tanımı ve Yaşayışı:

- **Salyangozlar:** Vücudu örten bir kabuk bulunur.. Kabuğu grimsi beyaz, kahverengi veya daha açık renktedir
- **Sümüklü böcekler:** Vücudu çıplaktır. Boyları 3-30 cm dir.
- Kışı dinlenerek geçirirler. İlkbaharda faaliyete geçerler.
- Toprakta açmış oldukları 8-10 cm derinlikteki çukurlara 60-70 yumurta bırakırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda gündüzleri aktif olmayıp, geceleri faaliyet gösterirler.

### Zarar Şekli:

- Tarla ve bahçelerde kültür bitkilerinin yaprak, sürgün ve meyvelerini kemirmek suretiyle zararlı olurlar.
- Kemirdikleri yaprakların yalnızca damarları kalabilir.

### Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Salyangoz ve sümüklü böcekler yazlık sebzelerde, fidanlarda, turunçgil ile birçok meyve ve orman ağaçlarında, buğday, arpa, tütün, patates, çilek ve süs bitkilerinde zararlı olurlar.

### Mücadele Yöntemleri:

#### Kültürel Önlemler:

- İlkbaharda popülasyon yoğunlukları az olduğu durumlarda toplanıp imha edilmelidir.

#### Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.