

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ

(*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*)



Yapraklarda lekelenme ve kuruma



Hiyarda yaprak lekeleri

Hastalık belirtisi:

- Hastalığın bulaşması bulaşık tohumlarla ya da toprakta kalan hastalıklı bitki artıklarıyla olur. Hastalığın yayılmasında sulama suyu da etkilidir.
- Çenek yapraklarda şeffaf, düzensiz, yağ lekeleri oluşur. Gerçek yapraklarda ise damarlarla sınırlanmış, köşeli, zamanla delinen yağ lekeleri görülür. Yaprakların alt yüzeyinde sabahın erken saatlerinde bakteriyel akıntı görüldüğünden hastalığa gözyaşı hastalığı da denmektedir.
- Meyvelerde küçük, yuvarlak, hafifçe çökük, sarı lekeler oluşur. Zamanla bu meyvelerde çürüme meydana gelir.

Hastalığın görüldüğü bitkiler :

- Hıyar ve diğer kabakgiller

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

- Temiz tohum kullanılmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları seralardan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
- Hastalığın görüldüğü seralarda en az 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.