

KABAKGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI

(*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*)



Yaprak üst yüzeyindeki külleme lekeleri



Yaprak üst yüzeyindeki külleme lekeleri



Yaprak üst yüzeyindeki külleme lekeleri

Hastalık belirtisi:

- Hastalık bitkilerin önce yaşlı yapraklarında görülür, daha sonra genç yapraklara da geçer.
- Öncelikle yaprağın üst yüzeyinde parça parça, nispeten yuvarlak lekeler belirir, sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini, yaprak sapını ve gövdeyi kaplar.
- Lekeler ilk zamanlarda beyaz renkte toz tabakası gibi görünür, zaman ilerledikçe esmerleşir.
- Yapraklar kuruyup dökülür ve bitkide gelişme durur. Bunun sonucu olarak da ürün kaybı meydana gelir.
- Hastalık için en uygun sıcaklık 27 °C'dir.

Hastalığın görüldüğü bitkiler:

- Hastalık kabakgillerde (hıyar, kavun, kabak, karpuz) görülür.

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

- Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

Kimyasal mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.