

KAVUN KARPUZDA ANTRAKNOZ HASTALIĐI

(*Coletotrichum lagenarium*)



Yapraktaki antraknoz belirtileri



Meyvedeki antraknoz belirtileri

Hastalık belirtisi:

- Antraknoz yapraklarda esmer veya siyaha yuvarlaĐa yakın gayri muntazam lekeler halinde belirir.
- Lekeler birleşip büyürler, buruşup parçalanırlar tüm yaprak hatta bütün bitki kuruyarak ölebilir.
- Yaprak sapları üzerinde uzunumsu, esmer hafif çökük lekeler meydana gelir.
- Meyvelerde 1–2 mm çapında büyük daire bazen da gayri muntazam çökük lekeler oluşturur. Daha sonra kavuniçi renk alması ile tanınır.
- Bu mantar Haziran, Temmuz ayları yağışlı geçen yıllarda salgın yaparak önemli seviyede ürün kaybına neden olur.

Hastalığın görüldüĐü bitkiler:

- Bu hastalığın konukçuları kavun, karpuz, hıyar ve kabak bitkileridir.

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler

- Tohumluk hastalığın görülmediĐi tarla veya bölgelerden alınmalı
- En az 3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı
- Tarladaki hastalıklı bitki artıkları imha edilmeli
- Hastalığın her yıl görüldüĐü yerlerde dayanıklı tohum kullanılmalıdır.

Kimyasal önlemler:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.