

NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĐI

(*Ascochyta rabiei*)



Kapsül lekeleri



Yaprak lekeleri

Hastalık belirtisi:

- En dikkat çekici belirti yaprak, sap ve tohum kapsüllerindeki lekelerdir.
- Sap ve dalları çepeçevre saran, düzensiz irilikte açık kahveden siyahımsı koyu kahverengine kadar değişen lekeler meydana gelir. Sap ve dallar bu lekeli yerlerden kırılır ve kısa zamanda kururlar.
- Tohum kapsülleri üzerinde iç içe dairesel lekeler meydana gelir. Bu lekelerin üzerinde toplu iğne başı büyüklüğünde siyah renkte yapılar görülür.
- Yapraklarda ise dairesel olan lekelerin çevresi sarı renk alır.
- Hastalık bol yağış alan yıl ve bölgelerde, sulama yapılan yerlerde, nispi nemi yüksek olan kapalı vadilerde salgınlara neden olabilir.

Hastalığın görüldüğü bitkiler:

- Hastalık nohutta görülür.

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

- Temiz tohum kullanılmalıdır.

- En az 2–3 yılda bir ekim nöbeti yapılmalı ve böylece hastalık etmeninin tarladan bulaşması önlenmelidir.
- Hasattan sonra, tohumluk 7–8 gün güneş altında yayılarak kurtulduktan sonra depoya alınmalıdır.
- Zamanında önlem alınmamış tarlalarda, hastalığın ilk görüldüğü ocaklardaki hastalıklı bitkiler sökülerek tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Ekim sırasında tohumların normal derinliğe düşmeleri sağlanmalıdır.
- Hastalığa dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.