

## PATATES MİLDİYÖSÜ (GEÇ YANIKLIK) HASTALIĞI

(*Phytophthora infestans*)



Yapraktaki ilk belirtiler



Yaprağın alt yüzeyindeki beyaz mantar tabakası

### Hastalık belirtisi:

- İlk belirtiler yaprakta küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekeler halinde görülür.
- Hastalığın ilerlemesiyle lekelerin olduğu kısımlar kahverengileşir ve doku ölür. Uygun koşullarda tüm bitkiye yayılır.
- Tarlada başlangıçta ocaklar halinde birkaç bitkide görülür, orantılı nemim %80 ve sıcaklığın 19–22 °C’de tüm tarlaya ve etraftaki tarlalara yayılır.
- Yumrulara yüzeysel kuru çürüklük şeklinde, düzensiz eflatun ile siyah renk arasında sert lekeler belirir. Hastalık yumru etine doğru ilerler.

### Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:

- Hastalık patates ve domateste görülür.

### Mücadele yöntemleri:

#### Kültürel önlemler:

- Hastalıklı bitki artıkları ve yumrular tarladan uzaklaştırılmalı
- Patates Tarımı çiğ tutmayan güneye bakan yerlerde yapılmalıdır

#### Kimyasal mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.