

ENGİNAR KURDU

(*Phragmacossia albid*)

Tanımı ve Yaşayışı:

- Kelebeklerin ön kanatları açık bej rengindedir.
- Yumurtası elips şeklindedir ve ilk bırakıldığında krem olan rengi, açılacağına yakın kahverengiye döner.
- Larvaların üzerinde enine kahverengi çizgiler bulunur.
- Kışı enginar kökleri içinde larva halinde geçirirler.
- Mart ayının sonundan itibaren, toprak sıcaklığının artmasıyla birlikte larvalar görülmeye başlar.
- Larvalar taze sürgün, çatlak ve memeciklerden bitkiye giderek beslenmeye başlar.

Zarar Şekli:

- Larvalar enginar kökleri içinde galeri açarak beslenir.
- İçinde buldukları gözün kurumasına ve köklerin içinin oyularak çürütmesine neden olurlar.
- İçi oyulan, gözleri körelen bitki kökü bir süre sonra çürür. Böylece 8-10 yıl ürün vermesi gereken bitki, 5-6 yılda kurumaktadır.
- Ege Bölgesi'nde enginar yetiştirilen alanlarda görülür.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Yalnız enginarda zararlıdır.

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

- Yaz sonunda ayırma ve boğaz doldurma işlemleri yapılırken kesilen köklerde larva görülmesi durumunda bu kökler yakılarak yok edilmelidir.
- Bulaşık tarlalardan çelik alıp, başka tarlaya dikilmemelidir.

Kimyasal mücadele:

- Önerilen bir kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.