

## MANTOLU BÖCEK

(*Amicta oberthuri*)



Mantolu böceğin oluşturduğu manto



Manto içindeki yumurtaları

### Tanımı ve Yaşayışı:

- Erginleri açık deve tüyü rengindedir.
- Yumurtalar sarı renkli, yassı ve hafif elips şeklindedir.
- Larvaların başı siyah ve parlak, gövde açık kahverengindedir.
- Mantolu böcek, kışı larva halinde korunaklı alanlarda geçirir.
- Nisan başından itibaren larvalar toprak yüzeyine çıkarak nohut ve mercimeğe geçer.
- Bitkilerin taze sürgün ve yapraklarıyla beslenir ve sürgünleri keser.
- Bu kesilen parçaların bir kısmını vücuduna yapıştırarak manto oluşturmaktadır.
- Mantoların renkleri beslendiği ortama bağlı olarak grimsi koyu kahverengi, saman rengi ve yeşilimsi olabilmektedir.

### Zarar Şekli:

- Larvaları, bitkileri hem yiyerek, hem de keserek kısa zamanda zarar vermektedir.
- Ayrıca bitkilerin sürgünlerini keserek bir kısmını mantolarına bağlamakta, diğer kısmı yerde birikmektedir.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış göstermektedir.

### Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki mercimek, nohut, buğday, arpa, kavun, karpuzda yaygındır.
- Bazı orman ve meyve ağaçları ile bahçe bitkileri de zararlı olduğu bitkiler arasındadır.

### Mücadele yöntemleri:

#### Kültürel önlemler:

- Çok sayıda bitkide zararlı olduğundan tarlada ve tarla çevresinde yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir.

#### Kimyasal mücadele:

- Kimyasal mücadele önerilmemektedir.