

## MERCİMEK HORTUMLU BÖCEĞİ

(*Sitona crinitus*)



Mercimek hortumlu böceğ ergini

### Tanımı ve Yaşayışı:

- Erginler 3-5 mm boyunda, kahverengi gri renklidir.
- Yumurta oval biçimde, önceleri kirli beyaz renkte olup daha sonra tamamen siyah renge dönüşür.
- Larva bacaksız olup, 4-5 mm boyunda, hafif kıvrık krem rengindedir.
- Kışı toprakta ergin dönemde geçirir. İlkbahar aylarında sıcaklığın yükselmesiyle birlikte topraktan çıkan erginler yumurtalarını yaprak, sap ve daha çok bitkinin kök boğazına yakın kısmına tek tek bırakırlar.
- Yumurtadan çıkan larva toprakta yaşar.
- Yılda 1 döl verir.

### Zarar Şekli:

- Erginler bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde, bitki 3-4 yapraklı dönemde iken zarar yaparlar. Zararlı çoğunlukla yaprakçıkların kenarlarını dıştan içe doğru yarım ay şeklinde yiyerek zarar yapar.
- Larvalar bitkinin kök ve nodozitelerinde beslenme yolu ile zararlı olur.
- Ülkemizin tüm bölgelerinde yaygındır.

### Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Genel olarak baklagil bitkilerinde zarar yapar. En çok zararlı olduğu bitkiler mercimek, bezelye, yonca, fiğ, fasulye ve korungadır.

### Mücadele yöntemleri:

#### Kültürel önlemler:

- Mercimek bitkilerinin ilk dönemlerinde hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla iyi bir toprak işleme yapılmalı ve tohumlar fazla derine ekilmemelidir.
- Ekim nöbeti uygulanmalı ve ara yıllarda uygun bir gübreleme yapılmalıdır.

#### Kimyasal mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.



Nodozitelerde beslenen larvaları



Yapraktaki zarar şekli