

SOĞAN PSİLLİDİ

(*Bactericera tremblay*)

Tanımı ve Yaşayışı:

- Ergin boyu 2-3 mm olup siyah renklidir.
- Larva 1-3 mm boyunda ve koyu sarı beyazımsı sarı arasında değişen bir renktedir.
- Erginler Doğu Anadolu Bölgesinde haziran ayında ortaya çıkar, dişiler yumurtalarını bitki gövdesi, yaprak sapı veya arasına kısa aralıklarla bırakır. Larvalar, yumurtaların bırakıldığı yerlerden fazla uzaklaşmadan beslenirler
- Erginler rahatsız edildiğinde sıçrayarak uçar.
- Çoğalmasını yaz ayları süresince devam ettirir.

Zarar Şekli:

- Erginlerin ve özellikle larvaların yapraklarda beslenmesi sonucunda soğan yaprakları bükülür veya helezoni olarak kıvrılır.
- Taze tüketim amacı ile yetiştirilen soğanlarda yaprağın şeklini bozduğu için kaliteyi etkilemektedir.
- Lahana gibi geniş yapraklı bitkilerin yapraklarında ise buruşma, sertleşme ve renk değişikliği görülür. Ancak lahanalarda zarar dış yapraklarda kaldığı için kalite ve verimi etkilememektedir.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Soğan, lahana ve bazı yabancıotlar konukçularıdır.

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

- Tarla içindeki yabancı otların temizliğine özen gösterilmelidir.
- Soğan ekim veya dikimi mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır.
- Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde hızlı gelişmelerini sağlamak amacı ile iyi bir gübreleme, düzenli sulama ve çapa işlemleri yapılır.

Kimyasal mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.