

## TOHUM SİNEĞİ

(*Delia platura*)



Tohum sineği ergini



Tohum sineği larvası



Tohum sineği zararı

### Tanımı ve Yaşayışı:

- Erginleri 6 mm boyunda gri renkli vücudu siyah kıllarla kaplı bir sinektir .
- Larvaları 5-6 mm boyda açık krem renğinde ön ve arka tarafları ince, fiçi şeklindedir.
- Bütün mevsim boyunca mevcut olan sinekler uygun koşullar bulunduğu anda aktif hale geçerler.
- Genellikle yeni sürülmüş ve sulanmış tarlalarda bulunur.
- Larvalar toprak içindeki organik maddelerde, toprakta çimlenmekte olan tohum veya fide varsa onlarda beslenirler.
- Yılda 3-4 döl verirler.

### Zarar Şekli:

- Tohum yatağı veya ocaklarda çimlenmekte olan tohumlarda, yeni süren yapraklarda, toprağın içindeki gövdede galeri açarlar .
- Fideler sararır ve kurur.
- Turfanda yetiştiricilikte zararı önemlidir.

### Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Kabak, fasulye, salatalık, kavun, karpuzun çimlenmekte olan tohumlarında zararlıdır.

### Mücadele yöntemleri:

#### Kültürel önlemler:

- Taze çiftlik gübresi yerine yanmış gübre kullanılmalıdır.

#### Kimyasal mücadele:

Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.